



VLIER (*Sambucus nigra*)

- Groeivorm:** grote struik (5-7 m), meerstammig, grondtak recht omhoog groeiend en in de bovenste helft uiteenvallend met een meer open karakter, onregelmatig vertakt, zeer lange jonge scheuten.
- Stam:** licht grijs, later grijs, kurkachtige schors.
- Blad:** tot 30cm, geveerd, donkergroen.
- Bloei:** vanaf juni tot augustus; ca. 2-3 weken; wit, in schermen, tot 20cm diameter; sterk geurend; na 5-7 jaar.
- Vrucht:** vanaf juli tot augustus; blauw tot zwart, bolvormig in schermen, eetbaar (gekookt of als sap).
- Wortel:** vlezig, oppervlakkig uitgroeiend, dicht en kort en kort vertakt, binnen de krooncirkel.
- Biotoop:** frisse, humusrijke zandige leem- of kleibodem, kan zich zeer snel aan gronden aanpassen, zwak zuur tot alkalisch, matig luchtverontreiniging verdragend, volle zon tot half schaduw.
- Herkomst:** bosranden, hagen, ondergroei in bossen in Europa en Azië.
- Gebruik:** in groepen, houtkanten, hagen, schermbeplanting, hakhout.
- Ecologie:** waardplant van *dahlica triquetrella* en *narycia duplicella*.