

Conference

Synoniemen

Geen gekend.

Herkomst

Engelse herkomst, sedert 1894 in de handel.

Boom

Groeit middelmatig sterk. Gesteltakken steil of schuin opstaand, voldoende vertakt, zijtakken gedeeltelijk horizontaal, later hangend. Vorm van de kruin hoogpiramidaal.

Productiviteit

Zeer vroeg en jaarlijks dragend. Vanaf het vierde jaar, bij volle dracht, is de opbrengst zeer hoog. Indien er een te hoge dracht is, is een uitdunning van de vruchten noodzakelijk.

Ziektegevoeligheid

Weinig vatbaar voor schurft, weinig vatbaar voor de vorming van steencellen, weinig gevoelig voor vruchtbruin en drukplekken, maar gauw beurs indien volledig rijp.

Vruchtbeschrijving

Vorm: Middelmatig groot tot groot; lang tot extreem lang peer- of flesvormig; midden- tot kelkbuikig, steelwaarts kegelvormig, versmald; vruchtzijden meestal symmetrisch, glad.

Steel: Tamelijk lange en dikke steel, dichtbij de vrucht groen, naar het einde overgaand in bruin.

Kelk: Middelmatig groot tot groot, open. Blaadjes gedeeltelijk omgekruld, meestal aan de basis vergroeid. Holte vlak, nauw, iets bultig, ook wel ontbrekend.

Schil: Glad, soepel, indien beroest ruw, dik, vast, korrelig. Als de vrucht volrijp is, kan de schil afgetrokken worden, wel schillen voor consumptie, anders storend. Grondkleur gemarmerd groenachtig geel; dekkleur, indien aanwezig, lichtoranje gevlekt.

Vlees: Vlak onder de schil groenachtig tot geelachtig wit, naar het klokhuis toe zalmgeel, zacht, smeltend, suikermeloenachtig, zeer sappig, zoet, nauwelijks zurig, kruidig.

Rijpt: Begin tot half september.

Gebruiksmogelijkheden

Dessertpeer van eerste kwaliteit, die ook in de keuken haar diensten bewijst en zeker in de strooptokerijen erg gewaardeerd wordt.

Soorteigenheid, beheervorm, aanplanttips, onderhoud

Geschikt op alle standplaatsen, groeit het best op voedzame gronden met voldoende vocht. Geschikt voor haagvorm en muurbeplanting. Na de vormsnoei blijven controleren en tijdig verjongen.

Bloei en bestuiving

Relatieve bloeiperiode: Middentijds.

Kwaliteit stuifmeel: Goed. Conference is gedeeltelijk zelfbestuivend en kan vrij gemakkelijk vruchten zetten zonder bevruchting (de zogenaamde parthenocarpe vruchten zonder pitten).

Mogelijke bestuivers: Williams Bon Chrétien, Calebasse Bosc, Doyenné du Comice, Légipont, Louise Bonne d'Avranches, Clapp's Favourite, Durondeau, Précoce de Trévoux, Seigneur Esperen, Triomphe de Vienne, Beurré Hardy.

